

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Datum: April 2009 **Neue Pillen!**



Name	Herz	Notenschlüssel	Smiley
Gewicht	188.8 mg	213.3 mg	210.7 mg
Durchmesser	8 mm	8.1 mm	8.1 mm
Dicke	4.2 mm	3.4 mm	3.6 mm
Bruchrille	Nein	Ja	Ja
Farbe	Dunkelrosa	Gelb - Beige	Weiss
Inhaltsstoff	<ul style="list-style-type: none"> • 9.2 mg Koffein • 13.7 mg m-CPP • Domperidon (Qual.) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.0 mg Koffein • 20.3 mg m-CPP • Domperidon (Qual.) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.2 mg Koffein • 35.9 mg m-CPP
Getestet in	Zürich, März 2009	Zürich, März 2009	Zürich, März 2009



Name	Herz		
Gewicht	187.6 mg		
Durchmesser	7.1 mm		
Dicke	4.1 mm		
Bruchrille	Nein		
Farbe	Dunkelrosa		
Inhaltsstoff	<ul style="list-style-type: none"> • 9.3 mg Koffein • 16.1 mg m-CPP • 16.8 mg Domperidon 		
Getestet in	Roggwil, März 2009		

Infos zu M-CPP

Substanz: M-CPP (Meta-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat in Pulverform. Wird meist als XTC in Pillenform verkauft. Konsumform: geschluckt. Therapeutische Dosis: ca. 50 mg

Wirkung: Eine schwache wahrnehmungsverändernde Wirkung und leichte Glücksgefühle können sich in seltenen Fällen einstellen.

Risiken und Nebenwirkungen (stellen sich bei den meisten Konsumenten ein): Kurzzeitnebenwirkungen sind **Kopfschmerzen**, Müdigkeit, Depressivität, Nervosität, Schweratmigkeit und **Übelkeit bis hin zum Erbrechen**. Nach dem Konsum oft mehrere Tage lang starke Niedergeschlagenheit.

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch



Achtung! verkauft als Ecstasy!

Achtung: Mischkonsum zusammen mit MDMA (Ecstasy) kann zu Krampfanfällen führen! Nach dem Konsum von m-CPP kann sich der Urin für 2-3 Tage rostbraun bis rötlich verfärben. Regelmässiger Konsum kann zu Depressionen, Angstzustände, psychomotorische Unruhe, sowie sexuellen Funktionsstörungen führen.

Infos zur Mischung m-CPP+Koffein

Neben den zuvor beschriebenen Wirkungen und Nebenwirkungen von m-CPP, birgt diese Mischung ein zusätzliches Risiko in Bezug auf Dehydration (Austrocknung). Dieses Risiko erhöht sich, wenn mehrere dieser Pillen innerhalb einer Nacht konsumiert werden. Die analysierten Mengen an Koffein rufen keinen leistungssteigernden Effekt hervor.

Infos zu Domperidon

Domperidon ist ein Arzneimittel, welches zur Behandlung und Vorbeugung von Erbrechen und Übelkeit Anwendung findet (Antiemetikum). Es gehört zur Gruppe der Dopamin-Antagonisten. Da Domperidon die Blut-Hirn-Schranke kaum überwinden kann, hat es keinen Einfluss auf das zentrale Nervensystem = keine psychoaktive Wirkung. Eine wichtige Nebenwirkung von Domperidon ist, neben Durchfall, eine Erhöhung des Prolaktinspiegels (körpereigenes Hormon), die zu nachlassender Libido, Menstruationsstörungen und Impotenz führen kann. In Kombination mit Medikamenten der Gruppe der HIV-Proteinase-Hemmer und der dualserotonergen Antidepressiva (DAS, Bsp. Nefazodon) führt der Konsum von Domperidon zu einem erhöhten Dopamin Anstieg. Dieser Anstieg kann zu einer Tachyarrhythmie (Herzrhythmusstörungen und schneller Herzschlag) führen.

Die maximale Dosis wird mit 80mg/Tag für erwachsene Personen angegeben!

Die Wechselwirkung zwischen m-CPP, Domperidon und Metoclopramid sind noch unerforscht!

Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf m-CPP nie nachspicken, man weiss nicht, welche Nebenwirkungen hohe Dosen m-CPP hervor rufen können.
- Vor dem Konsum von m-CPP ist abzuraten!

Quellen: Erowid.com, Wikipedia, know-drugs.ch, Arzneimittel Kompendium